

Médio/Alto

## RESPOSTA **AS PRINCIPAIS** DOENÇAS<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Avaliação da reação do híbrido às principais doenças em ambientes de alta incidência e severidade.



Moderamente suscetível

Moderamente tolerante

Tolerante

Doenças	S	MS	MT	Т
Ferrugem Polissora				
Mancha Branca				
Mancha de Turcicum				
Cercosporiose				
Enfezamentos				



#### **PONTOS FORTES**

Alto potencial produtivo Excelente sanidade foliar

Excelente qualidade de grãos

Ampla adaptação e boa tolerância à estiagem

Excelente opção para silagem



### RECOMENDAÇÕES

Tipo de grão:

Monitorar e manejar áreas com ocorrência de cigarrinha do milho

Responsivo ao uso de fungicidas

Evitar exposição prolongada no campo após o ponto da colheita



# **POSICIONAMENTO** TÉCNICO



SUL Terras Baixas (<700m) Terras Altas (>700m) Época de Plantio Cedo Normal Tardio Tardio Cedo Normal População (plantas/ha) 65-70 NR 65-75 NR **LESTE** Terras Baixas (<700m) Terras Altas (>700m) Época de Plantio Cedo Normal Tardio Cedo Normal Tardio População (plantas/ha) NR NR NR NR NR **CENTRO-NORTE** Terras Altas (>700m) Terras Baixas (<700m) Época de Plantio Cedo Normal Tardio Cedo Normal Tardio População (plantas/ha) 60-65 60-65 60-65 60-65 60-65 60-65 **OESTE** Época de Plantio Cedo Normal Tardio

5	Ц	l
_	Ξ	Ī

População (plantas/ha)

Época de Plantio

Cedo

Normal

55-60

Tardio

NR

NR

População (plantas/ha)

55-60

#### Terras Altas (>700m)

Época de Plantio

**LESTE** 

Cedo

Normal

Terras Baixas (<700m)

Tardio

Cedo

Normal

Tardio

População (plantas/ha)

NR

NR

**CENTRO-NORTE** 

Terras Baixas (<700m)

Terras Altas (>700m)

55-60

Época de Plantio

População (plantas/ha)

Cedo

Normal

Tardio

Cedo

Normal

Tardio

55-60

55-60

55-60

NR

**OESTE** 

Época de Plantio

População (plantas/ha)

Cedo

Normal

Tardio

55-60

55-60

OBS.: Os números referem-se às indicações de população x 1.000 plantas por hectare. LEGENDA: Preferencial

Tolerado

Não recomendado (NR)