



Ciclo:
Precoce



Finalidade:
Grãos



Altura da planta:
2,40m



Altura da espiga:
1,17m



GDU de Florescimento:
743



GDU de maturação fisiológica:
1515

Nível de Investimento:
Alto

Tipo de grão:
Duro amarelo/alaranjado

RESPOSTA ÀS PRINCIPAIS DOENÇAS¹

¹ Avaliação da reação do híbrido às principais doenças em ambientes de alta incidência e severidade.

| | |
|-----------|--------------------------|
| S | Suscetível |
| MS | Moderadamente suscetível |
| MT | Moderadamente tolerante |
| T | Tolerante |

| Doenças | S | MS | MT | T |
|--------------------|---|----|----|---|
| Ferrugem Comum | | | | |
| Ferrugem Polissora | | | | |
| Mancha Branca | | | | |
| Mancha de Turcicum | | | | |
| Cercosporiose | | | | |
| Enfezamentos | | | | |



PONTOS FORTES

- Excelente estabilidade e qualidade de grãos
- Ótima sanidade de colmo e de folha
- Ótima qualidade de raiz e colmo
- Ampla adaptação



RECOMENDAÇÕES

- Evitar plantio de milho sobre milho



POSICIONAMENTO TÉCNICO



VERÃO

| | SUL | | | Terras Baixas (<700m) | | | Terras Altas (>700m) | | |
|------------------------|-------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|----------------------|--------|--------|
| Época de Plantio | Cedo | Normal | Tardio | Cedo | Normal | Tardio | Cedo | Normal | Tardio |
| População (plantas/ha) | 65-75 | 65-75 | 55-65 | 65-75 | 65-75 | 55-65 | 65-75 | 65-75 | 55-65 |
| | LESTE | | | Terras Baixas (<700m) | | | Terras Altas (>700m) | | |
| Época de Plantio | Cedo | Normal | Tardio | Cedo | Normal | Tardio | Cedo | Normal | Tardio |
| População (plantas/ha) | 70-75 | 70-75 | 65-70 | 72-78 | 72-78 | 67-72 | 72-78 | 72-78 | 67-72 |
| | OESTE | | | | | | | | |
| Época de Plantio | Cedo | Normal | Tardio | | | | | | |
| População (plantas/ha) | 60-70 | 60-65 | 60-65 | | | | | | |

SAFRINHA

| | SUL | | | | | | | | |
|------------------------|--------------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|----------------------|--------|--------|
| Época de Plantio | Cedo | Normal | Tardio | | | | | | |
| População (plantas/ha) | 60-65 | 60-65 | 55-60 | | | | | | |
| | LESTE | | | Terras Baixas (<700m) | | | Terras Altas (>700m) | | |
| Época de Plantio | Cedo | Normal | Tardio | Cedo | Normal | Tardio | Cedo | Normal | Tardio |
| População (plantas/ha) | 58-62 | 58-62 | 52-58 | 63-68 | 63-68 | 55-60 | 63-68 | 60-65 | 55-60 |
| | CENTRO-NORTE | | | Terras Baixas (<700m) | | | Terras Altas (>700m) | | |
| Época de Plantio | Cedo | Normal | Tardio | Cedo | Normal | Tardio | Cedo | Normal | Tardio |
| População (plantas/ha) | 60-65 | 60-65 | 55-60 | 62-67 | 62-67 | 57-62 | 62-67 | 62-67 | 57-62 |
| | OESTE | | | | | | | | |
| Época de Plantio | Cedo | Normal | Tardio | | | | | | |
| População (plantas/ha) | 60-70 | 60-65 | 60-65 | | | | | | |